



1. La curva timpanometriche di tipo A:
 - a) indica una equipressione fra orecchio medio e atmosfera
 - b) presuppone la normoevocabilità di riflessi stapediale
 - c) esclude una patologia di tipo trasmissivo
 - d) nessuna delle precedenti
 - e) tutte le precedenti
2. Le ABR:
 - a) sono caratterizzate da una serie di onde che si manifestano entro 10 msec
 - b) sono specifiche in frequenza
 - c) garantiscono una precisa determinazione della soglia
 - d) nessuna delle precedenti
 - e) tutte le precedenti
3. La riabilitazione vestibolare:
 - a) mira al recupero della funzione di una struttura periferica "alterata"
 - b) si avvale di manovre liberatorie aspecifiche
 - c) viene eseguita in caso di malattia di Menière
 - d) richiede sempre un supporto farmacologico
4. La rieducazione vestibolare:
 - a) consente il recupero della funzione dell'equilibrio in presenza di una struttura periferica irreversibilmente lesa
 - b) consente di accelerare il compenso vestibolare
 - c) si avvale di esercizi strettamente personalizzati
 - d) tutte delle precedenti
5. Il Bow and Lean test:
 - a) Può modificare la velocità angolare della fase lenta di un nistagmo orizzontale
 - b) Può generare un nistagmo orizzontale
 - c) Può modificare la direzione di un nistagmo orizzontale
 - d) Tutte le precedenti
6. I recettori vestibolari:
 - a) Sono dei recettori sensibili alla velocità
 - b) Sono recettori sensibili alle accelerazioni
 - c) Sono recettori sensibili sia alla velocità sia alle accelerazioni
 - d) Rispondono alla velocità o alle accelerazioni a seconda delle posizioni del capo

7. L'ipoacusia pseudo-trasmissiva:

- a) è caratterizzata da un aumento di impedenza dell'orecchio interno
- b) si può riscontrare in caso di deiscenza del CS superiore
- c) è caratterizzata da normoevocabilità dei riflessi stapediai
- d) nessuna delle precedenti
- e) tutte le precedenti

8. L'assenza delle Otoemissioni (teoe, dpoae) è suggestivo di una ipoacusia entro

- a) 70 Db HI
- b) 50 Db HI
- c) 35-40 Db HI
- d) Oltre 70Db HI

9. Nel sospetto di presenza di una terza finestra labirintica quale test può essere

indicativo

- a) Esame audiometrico tonale per via aerea
- b) Test della fistola (impedenzometrico)
- c) Decay test (test di Anderson)
- d) ABR a soglia con tone burst

10. Quali delle seguenti tecniche nella riabilitazione vestibolare ha come scopo la habituation

- a) Herdman-tusa
- b) Five
- c) Training otticocinetico
- d) Camminare su percorsi prestabiliti

11. Cos'è l'Equitest?

- a) E' un test che esamina la postura statica e la marcia
- b) E' un test che esamina la postura statica
- c) E' uno strumento utilizzato con solo finalità riabilitative
- d) E' uno strumento utilizzato con finalità riabilitative e diagnostiche

12. Il test al glicerolo si somministra per svelare una ipoacusia fluttuante nel caso di

sospetto di:

- a) Idrope endolinfatica
- b) Otosclerosi coclearizzata



- c) Sindrome di Minor
- d) Ipoacusia autoimmune

13. Quale è la forma di VPPB che si presenta più frequentemente

- a) Canale semicircolare posteriore
- b) Canale semicircolare anteriore
- c) Canale semicircolare laterale
- d) Una forma mista dove due canali sono coinvolti contemporaneamente

14. La vertigine parossistica da posizionamento benigna è caratterizzata:

- a) Da vertigine di breve durata oggettiva elicitata da particolari movimenti
- b) Da instabilità
- c) Da una guarigione spontanea nella maggior parte dei casi
- d) Tutte le precedenti

15. L'Head Shaking Test valuta:

- a) Il guadagno dinamico del VOR
- b) Si avvale di un segno non Nistagmico
- c) È un test a bassa frequenza
- d) Tutte le precedenti

16. La vertigine è

- a) Una sensazione di rotazione dell'ambiente
- b) Una sensazione di rotazione di se stesso
- c) Un sintomo corticale
- d) Tutte le precedenti

17. L'otorrea fetida:

- a) È spesso indice di una concomitante otosclerosi
- b) Causa la formazione di abbondante cerume
- c) È quasi sempre indice di un processo osteitico
- d) È costantemente associata a ipoacusia percettiva

18. In caso di paralisi del nervo facciale, quando il processo che la provoca è situato a monte del punto in cui il ramo destinato allo stapedio si stacca dal tronco del nervo facciale:

- a) Si ha l'effetto "On-Off"
- b) Il riflesso stapediale è assente
- c) Il riflesso stapediale è presente
- d) Nessuna delle precedenti

19. Nella prova di Weber:

- a) Si appoggia il diapason al vertice per poi comprimere aria nel condotto uditivo esterno
- b) Si appoggia il diapason sul padiglione auricolare
- c) Il soggetto affetto da ipoacusia trasmissiva destra localizzerà il suono a sinistra
- d) Il soggetto affetto da ipoacusia trasmissiva destra localizzerà il suono a destra

20. Le cellule di Deiters fanno parte:

- a) della membrana timpanica
- b) dell'organo di Corti
- c) del nervo acustico
- d) del nucleo olivare superiore mediale

21. La platina della staffa è contenuta nella:

- a) finestra rotonda
- b) finestra quadrata
- c) finestra ovale
- d) finestra esagonale